Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 28. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesla následující dotazy:

1) O kolik % má menší šanci plně očkovaná osoba (osoba min.14.dní po 2.dávce vakcíny proti Covid-19) nakazit se po tzv. rizikovém kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou než neočkovaná osoba. Co je považováno za rizikový kontakt.

2) O kolik % je menší riziko přenosu z Covid-19 pozitivní plně očkované osoby (osoba min.14.dní po 2.dávce vakcíny proti Covid-19) než z Covid-19 pozitivní neočkované osoby.

3) Na základě které odborné studie byly tyto hodnoty zjištěny.

4) Zda je nařízena karanténa a kontrolní PCR test plně očkované osobě po rizikovém kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou a plně očkované osobě žijící a pobývající ve společné domácnosti s Covid-19 pozitivní osobou nebo osobami.

uvádíme následující:

Ad 1, Ad 2, Ad 3)

U očkované osoby dochází po aplikaci kompletního očkovacího schématu ke stimulaci imunitního systému a k nastolení buněčné a protilátkové odpovědi proti CoVid. Tato imunitní odpověď na očkování poskytuje dostatečně vysokou ochranu před vznikem onemocnění COVID-19, před závažným průběhem, hospitalizacemi nebo úmrtím, což bylo potvrzeno v řadě klinických studiích fáze I-III u všech registrovaných covid-19 vakcín. Výsledky těchto studií jsou veřejně dostupné v jednotlivých odborných časopisech, kde byly publikovány. Účinnost těchto vakcín před příznakovým onemocněním covid-19 se pohybuje od 81-95 %. Přítomnost koronaviru na sliznicích očkovaných osob zatím nelze zcela vyloučit – dosud nebyla prokázána tzv. „sterilní imunita“, která nebyla prokázaná ani u jiných očkování proti respiračním onemocněním, jako je např. chřipka nebo černý kašel.

Již první výsledky studií potvrzují vysokou účinnost na redukci přenosu viru u očkovaných osob, proto pravděpodobnost, že by očkovaný jedinec onemocněl a došlo k tak masivnímu množení viru na jeho sliznicích, které by umožňovalo jeho přenos na další osoby, je zcela minimální. Proto se očkovaný jedince považuje za nevnímavého k nákaze, nestává se základním článkem epidemického procesu a není zdrojem nákazy pro své okolí.

Ad 4)

Lidé očkovaní proti covidu-19 po významném kontaktu s nakaženým, například v domácnosti, musí pátý až sedmý den po kontaktu na PCR test. Do karantény ale před jeho negativním výsledkem dál nemusí.

S pozdravem

v z. Ing. Daniela Matějková
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy
elektronicky podepsáno