

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

2023–2024

PRVNÍ AKTUALIZACE



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Verze 02_2023

Aktualizace: 25. září 2023 (nahrazuje verzi ze dne 4. srpna 2023)

Datum změny	Předmět úpravy	Změnu provedl
25-9-2023	Úprava doporučeného typu vakcín s ohledem na schválení a dostupnost nové vakcíny XBB.1.5	Mgr. Zdeněk Kyselý
Schválil:	Centrální řídicí tým	



Doporučení k očkování proti covid-19 bylo vypracováno ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem



Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 pro sezónu 2023/2024 se s ohledem na vývoj epidemiologické situace může měnit.

ÚVOD

I když se vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 (dále také „covid-19“) za poslední tři roky významně změnil a covid-19 již není Světovou zdravotnickou organizací (WHO) klasifikován jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, očkování stále představuje základní preventivní nástroj v ochraně před závažným průběhem tohoto onemocnění, hospitalizací a úmrtím.

V souladu s doporučeními Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)¹, Světové zdravotnické organizace, Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)¹, a odborných společností a na základě zhodnocení přístupů k očkování v zahraničí se doporučuje, aby v otázce očkování před sezonou respiračních infekcí byl kladen důraz zejména na očkování osob, které jsou více ohroženy závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím. Mezi ohrožené skupiny patří osoby ve věku 60 let a starší, osoby s oslabeným imunitním systémem, osoby se základními onemocněními, které jsou ve vyšším riziku závažného průběhu onemocnění covid-19 bez ohledu na věk, a také těhotné ženy.

¹ [ECDC-EMA statement on updating COVID-19 vaccines composition for new SARS-CoV-2 virus variants \(europa.eu\)](https://www.europa.eu/press-room/media/30622/en/statement-ecdc-ema-covid-19-vaccines-composition)

Očkování by měli zvážit také zdravotničtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách v přímém kontaktu s pacienty/klienty, a to vzhledem k jejich pravděpodobné zvýšené expozici onemocnění covid-19 a jejich klíčové roli ve fungování systémů zdravotní a sociální péče.

Většina osob má postinfekční nebo postvakcinační imunitu, případně hybridní imunitu, ale ta nemusí být dostatečná s ohledem na skutečnost, že imunita po onemocnění covid-19 není trvalá. Očkování se proto doporučuje také osobám, které onemocnění prodělaly. Osobám, které dosud nebyly očkovány, se doporučuje očkování jednou dávkou monovalentní adaptované vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5.

NAČASOVÁNÍ OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19

I když virus SARS-CoV-2 cirkuluje v populaci celoročně a onemocnění covid-19 nemá tak výraznou sezónnost jako např. chřipka, je z dat vývoje počtu hospitalizací zřejmé, že počet závažných průběhů narůstá v průběhu podzimu a zimy, a proto se také primárně doporučuje absolvování očkování proti onemocnění covid-19 před nástupem podzimu.

Sjednocení podzimních očkovacích kampaní proti chřipce a onemocnění covid-19 se může jevit jako vhodné nejen z důvodu zaměření na stejné cílové skupiny, ale také s ohledem na jejich organizaci a komunikaci.

Obecně však i nadále platí, že je možné se proti covid-19 nechat očkovat kdykoliv v průběhu roku.

SKUPINY OSOB ve zvýšeném riziku závažnějšího průběhu onemocnění covid-19 s potřebou hospitalizace

- věk 60 let a starší
- závažná porucha imunity
- závažné chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci
- závažné chronické onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak
- chronické selhání jater a ledvin
- obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m²
- Diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulinem
- Downův syndrom
- stavy se zvýšenou srážlivostí krve
- těhotné ženy

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 80 let a starší a pro klienty pobytových sociálních služeb jakéhokoliv typu

Osobám ve věku 80 let a více a klientům pobytových sociálních služeb se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku podstoupily alespoň jedno očkování, nejlépe před očekávanou podzimní sezónou. O optimálním načasování očkování je vždy vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje 1 dávka adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5. Tyto osoby mohou být očkovány i další dávkou adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5, pokud od předchozího očkování proti covid-19 uplynuly nejméně 4 měsíce.

Osobám, které byly v minulosti očkovány jinými očkovacími látkami, než je očkovací látka zaměřená na Omikron XBB.1.5, se doporučuje očkování 1 dávkou této adaptované vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5, a to nejméně 4 měsíce od poslední dávky očkování proti covid-19.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 60-79 let a pro osoby patřící do skupiny osob se základními onemocněními (ve věku 18+)

Osobám ve věku 60-79 let a osobám z rizikových skupin ve věku 18 let a více se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku absolvovaly alespoň jedno očkování proti onemocnění covid-19.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24. Toto doporučení platí bez ohledu na počet dávek, které osoba dříve obdržela.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje 1 dávka adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5.

Osobám, které byly v minulosti očkovány jinými očkovacími látkami, než je očkovací látka zaměřená na Omikron XBB.1.5, se doporučuje očkování 1 dávkou této adaptované vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5, a to nejméně 4 měsíce od poslední dávky očkování proti covid-19.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 18 až 59 let (bez rizikových faktorů)

Osobám ve věku 18 až 59 let se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku na základě individuálního zhodnocení potřebnosti očkování postoupily očkování jednou dávkou.

Očkování v této věkové skupině je doporučeno například zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách nebo osobám, které pečují o osoby ve zvýšeném riziku závažnějšího průběhu onemocnění.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24. Toto doporučení platí bez ohledu na počet dávek, které osoba dříve obdržela.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje 1 dávka adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5.

Osobám, které byly v minulosti očkovány jinými očkovacími látkami, než je očkovací látka zaměřená na Omikron XBB.1.5, se doporučuje očkování 1 dávkou této adaptované vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5, a to nejméně 4 měsíce od poslední dávky očkování proti covid-19.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro děti a mladistvé ve věku 6 měsíců až 17 let

Dětem a mladistvým patřícím do skupiny osob ve zvýšeném riziku závažnějšího průběhu onemocnění covid-19 s potřebou hospitalizace se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku, a to na základě individuálního zhodnocení potřeby očkování lékařem, podstoupili očkování jednou dávkou.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24.

Očkování se provádí dostupnými vakcínami určenými pro danou věkovou skupinu a dle doporučeného očkovacího schématu.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby s oslabeným imunitním systémem

Osoby s oslabeným imunitním systémem mají po očkování slabší imunitní odpověď, proto se jim doporučuje aplikovat minimálně tři dávky v odstupu nejméně 4 měsíce mezi první a druhou dávkou a 8 týdnů mezi druhou a třetí dávkou, z nichž alespoň jedna musí být monovalentní vakcína XBB.1.5; o počtu dávek a rozestupu mezi jednotlivými dávkami rozhoduje ošetřující lékař.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ osobám, které prodělaly onemocnění covid-19

Očkování se doporučuje i osobám, které onemocnění covid-19 prodělaly, jelikož postinfekční imunita po prodělaném onemocnění vyvolaném dříve cirkulujícími variantami nemusí být dostatečná v prevenci onemocnění způsobeného variantami, které aktuálně cirkulují v populaci. Očkování snižuje riziko reinfekce a závažného průběhu. Optimální nastavení termínu očkování po prodělaném onemocnění je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Zahájení očkování či podání kterékoli dávky u imunokompetentních osob s nízkým rizikem závažného průběhu se doporučuje odložit o 3 - 6 měsíců po onemocnění.

DOSTUPNOST OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19

Očkování proti onemocnění covid-19 je nadále bezplatně dostupné každému zájemci, který nemá kontraindikaci k očkování či posilující dávce dostupnou vakcínou dle platného souhrnu údajů o přípravku (SmPC) schváleném v EU.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ OČKOVACÍCH LÁTEK NA SEZONU 2023/2024

S ohledem na současný vývoj epidemiologické situace a na základě výskytu aktuálně cirkulujících variant viru SARS-CoV-2 je doporučováno primárně podání adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5.

PODROBNÉ INFORMACE O VAKCÍNÁCH URČENÝCH K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

COMIRNATY

[Comirnaty | European Medicines Agency \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

SPIKEVAX

[Spikevax \(previously COVID-19 Vaccine Moderna\) | European Medicines Agency \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

NUVAXOVID

[Nuvaxovid | European Medicines Agency \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

JCOVDEN

[Jcovden \(previously COVID-19 Vaccine Janssen\) | European Medicines Agency \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

VIDPREVTYN BETA

[VidPrevtyn Beta | European Medicines Agency \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

Další informace o očkování proti covid-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, včetně informací o očkovacích místech, kde je možné se nechat proti onemocnění covid-19 očkovat.



Podrobnější odborné informace k očkování proti covid-19 (např. v otázce možných kontraindikací, simultánní aplikace nebo časového odstupu při podávání různých vakcín) lze nalézt na stránkách odborných společností.



ZDRAVÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!